

## Estados da partícula livre: ondas planas versus ondas esféricas

A Hamiltoniana do sistema de uma partícula livre é dada por:  $H_0 = \frac{\mathbf{p}^2}{2m}$

que em suas dimensões cartesianas fica  $H_0 = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{p_z^2}{2m}$ . Para definir uma base, escolha  $|k'_x\rangle \rightarrow p_x|k'_x\rangle = \hbar k'_x|k'_x\rangle$  e construa  $|\mathbf{k}'\rangle = |k'_x\rangle \otimes |k'_y\rangle \otimes |k'_z\rangle$  de tal forma que  $H_0|\mathbf{k}'\rangle = \frac{\hbar^2(k_x'^2 + k_y'^2 + k_z'^2)}{2m}|\mathbf{k}'\rangle = \frac{\hbar^2\mathbf{k}'^2}{2m}|\mathbf{k}'\rangle = \frac{\mathbf{p}'^2}{2m}|\mathbf{k}'\rangle$ .

Na representação das coordenadas, temos  $\langle \mathbf{x}' | \mathbf{k}' \rangle = \frac{e^{i\mathbf{k}' \cdot \mathbf{x}'}}{(2\pi)^{3/2}}$ . Para obter isso,

percebemos que  $[H_0, \mathbf{p}] = 0$  e usamos uma base de autokets de  $\mathbf{p} \rightarrow |\mathbf{k}'\rangle$  com  $\langle \mathbf{k}' | \mathbf{k}'' \rangle = \delta(\mathbf{k}' - \mathbf{k}'')$ . Quando necessário, outra nomenclatura:  $\{|E, \hat{\mathbf{k}}\}$ .

Acontece que  $[H_0, \mathbf{L}^2] = [H_0, L_z] = 0$  e poderíamos procurar por uma base

$$\{|E, \ell, m\rangle\} \text{ tal que } \begin{cases} H_0|E, \ell, m\rangle = E|E, \ell, m\rangle \\ \mathbf{L}^2|E, \ell, m\rangle = \ell(\ell + 1)\hbar^2|E, \ell, m\rangle \\ L_z|E, \ell, m\rangle = m\hbar|E, \ell, m\rangle \\ \langle E', \ell', m' | E, \ell, m \rangle = \delta_{\ell\ell'}\delta_{mm'}\delta(E - E') \end{cases}$$

*Pergunta: como uma base se relaciona com a outra?*

## Estados da Partícula Livre: ondas planas versus ondas esféricas

Sabemos fazer esta conexão:  $|E, \ell, m\rangle = \int d^3k |\mathbf{k}\rangle \underbrace{\langle \mathbf{k} | E, \ell, m \rangle}$

*precisamos achar isso*

Um chute, baseado nas propriedades esperadas:  $\langle \mathbf{k} | E, \ell, m \rangle = A g_{\ell E}(k) Y_{\ell}^m(\hat{\mathbf{k}})$

*Como provar que a fórmula escolhida para  $\langle \mathbf{k} | E, \ell, m \rangle$  é apropriada?*

Se acharmos a conexão com  $|k\hat{\mathbf{z}}\rangle$ , podemos rodá-lo para obter  $|\mathbf{k}\rangle$ , pois

$$|\mathbf{k}\rangle = \mathcal{D}(\alpha = \phi, \beta = \theta, \gamma = 0) |k\hat{\mathbf{z}}\rangle$$

Assim vamos atrás de  $|k\hat{\mathbf{z}}\rangle$ . Sabendo que

$|k\hat{\mathbf{z}}\rangle = |k_x = 0, k_y = 0, k_z\rangle$  aplique  $L_z$  para obter

$$L_z |k\hat{\mathbf{z}}\rangle = (xp_y - yp_x) |k_x = 0, k_y = 0, k_z\rangle = 0,$$

pois  $p_y$  (ou  $p_x$ )  $|k_x = 0, k_y = 0, k_z\rangle = 0$ . Onde se

conclui: *momento angular é nulo na direção de propagação*. Classicamente


já era, pois  $\mathbf{L} \cdot \mathbf{p} = (\mathbf{r} \times \mathbf{p}) \cdot \mathbf{p} = 0$ . Mas, se  $L_z |k\hat{\mathbf{z}}\rangle = 0 \rightarrow |k\hat{\mathbf{z}}\rangle$  é autoket de  $L_z$

com autovalor 0. Ao mesmo tempo,  $L_z |E, \ell, m\rangle = m\hbar |E, \ell, m\rangle$ . Isto implica

que  $\langle E', \ell', m' | k\hat{\mathbf{z}} \rangle = 0$ , se  $m' \neq 0$  (autokets de um operador Hermiteano com

autovalores distintos são ortogonais). Com isso aprendemos algo:

$$|k\hat{\mathbf{z}}\rangle = \sum_{\ell' m'} \int dE' |E', \ell', m'\rangle \langle E', \ell', m' | k\hat{\mathbf{z}} \rangle \text{ pode ser reduzido à}$$



## Estados da Partícula Livre: ondas planas versus ondas esféricas

$$\implies |k\hat{\mathbf{z}}\rangle = \sum_{\ell'} \int dE' |E', \ell', m' = 0\rangle \langle E', \ell', m' = 0|k\hat{\mathbf{z}}\rangle$$

Uma vez que  $|\mathbf{k}\rangle = \mathcal{D}(\alpha = \phi, \beta = \theta, \gamma = 0)|k\hat{\mathbf{z}}\rangle$ , podemos escrever:

$$\langle E, \ell, m|\mathbf{k}\rangle = \sum_{\ell'} \int dE' \langle E, \ell, m|\mathcal{D}(\alpha = \phi, \beta = \theta, \gamma = 0)|E', \ell', m' = 0\rangle \times$$

$\times \langle E', \ell', m' = 0|k\hat{\mathbf{z}}\rangle$ . Lembre que  $\mathcal{D}$  é de fato um operador que depende apenas

de  $L_i$  (sua forma geral é  $\mathcal{D} = \exp\left(-i\frac{J_z\alpha}{\hbar}\right) \exp\left(-i\frac{J_y\beta}{\hbar}\right) \exp\left(-i\frac{J_z\gamma}{\hbar}\right)$ ) e  $\therefore$

é incapaz de mudar  $\ell'$  e  $E'$ . Com isso em mente, podemos escrever:

$$\langle E, \ell, m|\mathbf{k}\rangle = \sum_{\ell'} \int dE' \delta(E' - E) \delta_{\ell'\ell} \underbrace{\mathcal{D}_{m0}^{(\ell')}(\alpha = \phi, \beta = \theta, \gamma = 0)} \langle E', \ell', m' = 0|k\hat{\mathbf{z}}\rangle$$

Isso é conhecido, fórmula 3.6.52 do livro,  $\sqrt{\frac{4\pi}{2\ell+1}} Y_{\ell'}^{m*}(\hat{\mathbf{k}})$ . Assim, obtemos

que  $\langle E, \ell, m|\mathbf{k}\rangle = \sqrt{\frac{4\pi}{2\ell+1}} Y_{\ell}^{m*}(\hat{\mathbf{k}}) \langle E, \ell, m=0|k\hat{\mathbf{z}}\rangle$ . Tome o complexo conjugado

para comparar com fórmula do slide anterior, e conclua que a proposta estava

correta, pois  $g_{\ell E}(k) = \langle E, \ell, m=0|k\hat{\mathbf{z}}\rangle^* \rightarrow$  não depende de  $\theta$  e  $\phi$  e depende

apenas de  $E, k$  e  $\ell$ . E assim,  $\langle \mathbf{k}|E, \ell, m\rangle = \sqrt{\frac{4\pi}{2\ell+1}} g_{\ell E}(k) Y_{\ell}^m(\hat{\mathbf{k}})$ .

## Estados da Partícula Livre: ondas planas versus ondas esféricas

Para calcular  $g_{\ell E}(k)$ , comece com  $(H_0 - E)|E, \ell, m\rangle = 0$  e multiplique pela esquerda por  $\langle \mathbf{k} |$  para obter:

$$\left(\frac{\hbar^2 k^2}{2m} - E\right) \langle \mathbf{k} | E, \ell, m \rangle = 0 \Rightarrow \langle \mathbf{k} | E, \ell, m \rangle = 0 \text{ sempre que } \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \neq E \quad \therefore$$

$\langle \mathbf{k} | E, \ell, m \rangle$  é uma função delta. Podemos escrever isso da seguinte forma

$$\left(\frac{\hbar^2 k^2}{2m} - E\right) g_{\ell E}(k) Y_{\ell}^m(\hat{\mathbf{k}}) = 0 \text{ (ver slide 2) com } g_{\ell E}(k) = N \delta\left(\frac{\hbar^2 k^2}{2m} - E\right)$$

Para achar  $N$ , que tal usarmos  $\langle E', \ell', m' | E, \ell, m \rangle = \delta(E - E') \delta_{\ell \ell'} \delta_{m m'} =$

$$\begin{aligned} &= \int d^3 k'' \langle E', \ell', m' | \mathbf{k}'' \rangle \langle \mathbf{k}'' | E, \ell, m \rangle = \frac{4\pi}{2\ell + 1} \int k''^2 dk'' \int d\Omega_{\hat{\mathbf{k}}''} g_{\ell' E'}^*(k'') \times \\ &\times g_{\ell E}(k'') Y_{\ell'}^{m'*}(\hat{\mathbf{k}}'') Y_{\ell}^m(\hat{\mathbf{k}}'') = \frac{4\pi}{2\ell + 1} \int k''^2 dk'' \int d\Omega_{\hat{\mathbf{k}}''} |N|^2 \delta\left(\frac{\hbar^2 k''^2}{2m} - E'\right) \times \\ &\times \delta\left(\frac{\hbar^2 k''^2}{2m} - E\right) Y_{\ell'}^{m'*}(\hat{\mathbf{k}}'') Y_{\ell}^m(\hat{\mathbf{k}}''). \end{aligned}$$

Se considerarmos que  $\frac{\hbar^2 k''^2}{2m} = E'' \Rightarrow \frac{\hbar^2 k''}{m} dk'' = dE'' \Rightarrow k''^2 dk'' = \frac{m}{\hbar^2} k'' dE''$ ,

podemos escrever:  $\langle E', \ell', m' | E, \ell, m \rangle = \frac{4\pi}{2\ell + 1} \int \frac{m}{\hbar^2} k'' dE'' \int d\Omega_{\hat{\mathbf{k}}''} |N|^2 \times$

$\times \delta(E'' - E') \delta(E'' - E) Y_{\ell'}^{m'*}(\hat{\mathbf{k}}'') Y_{\ell}^m(\hat{\mathbf{k}}'')$  e ao fazer a integral, temos

## Estados da Partícula Livre: ondas planas versus ondas esféricas

$$\langle E', \ell', m' | E, \ell, m \rangle = \frac{4\pi}{2\ell + 1} \frac{m}{\hbar^2} k |N|^2 \delta(E' - E) \delta_{\ell'\ell} \delta_{m'm},$$

onde usamos que

$$\begin{cases} \int dE'' f(E'') \delta(E'' - E') \delta(E'' - E) = f(E) \delta(E' - E) \\ \int d\Omega_{\hat{\mathbf{k}}''} Y_{\ell'}^{m'*}(\hat{\mathbf{k}}'') Y_{\ell}^m(\hat{\mathbf{k}}'') = \delta_{\ell'\ell} \delta_{m'm} \end{cases}$$

Comparação direta com  $\langle E', \ell', m' | E, \ell, m \rangle = \delta(E' - E) \delta_{\ell'\ell} \delta_{m'm}$  nos leva à

$$|N|^2 = \frac{\hbar^2}{mk} \frac{2\ell + 1}{4\pi} \Rightarrow N = \frac{\hbar}{\sqrt{mk}} \sqrt{\frac{2\ell + 1}{4\pi}} \text{ e finalmente}$$

$$\langle \mathbf{k} | E, \ell, m \rangle = \sqrt{\frac{4\pi}{2\ell + 1}} \frac{\hbar}{\sqrt{mk}} \delta\left(\frac{\hbar^2 k^2}{2m} - E\right) \sqrt{\frac{2\ell + 1}{4\pi}} Y_{\ell}^m(\hat{\mathbf{k}}) \text{ ou}$$

$$\langle \mathbf{k} | E, \ell, m \rangle = \frac{\hbar}{\sqrt{mk}} \delta\left(\frac{\hbar^2 k^2}{2m} - E\right) Y_{\ell}^m(\hat{\mathbf{k}})$$

Podemos usar este resultado para escrever  $|\mathbf{k}\rangle = \sum_{\ell m} \int dE |E, \ell, m\rangle \langle E, \ell, m | \mathbf{k}\rangle$

ou ainda  $|\mathbf{k}\rangle = \sum_{\ell m} |E, \ell, m\rangle \Big|_{E=\frac{\hbar^2 k^2}{2m}} \frac{\hbar}{\sqrt{mk}} Y_{\ell}^{m*}(\hat{\mathbf{k}})$ . E o  $\langle \mathbf{x} | \mathbf{k}\rangle$ ?

## Estados da Partícula Livre: ondas planas versus ondas esféricas

$$\langle \mathbf{x} | \mathbf{k} \rangle = \frac{e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}}}{(2\pi)^{3/2}} = \sum_{\ell m} \langle \mathbf{x} | E, \ell, m \rangle \frac{\hbar}{\sqrt{mk}} Y_{\ell}^{m*}(\hat{\mathbf{k}}), \text{ onde } \langle \mathbf{x} | E, \ell, m \rangle = c_{\ell} j_{\ell}(kr) Y_{\ell}^m(\hat{\mathbf{r}})$$

Para casa (1): *mostre que*  $c_{\ell} = \frac{i^{\ell}}{\hbar} \sqrt{\frac{2mk}{\pi}}$ . *Para isso, use teorema de adição,*

$$\sum_m Y_{\ell}^m(\hat{\mathbf{r}}) Y_{\ell}^{m*}(\hat{\mathbf{k}}) = \frac{2\ell + 1}{4\pi} P_{\ell}(\hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{r}})$$

e que  $j_{\ell}(kr) \equiv \frac{1}{2i^{\ell}} \int_{-1}^{+1} e^{ik \cos \theta} P_{\ell}(\cos \theta) d(\cos \theta)$ .

### Resumo

$$\langle \mathbf{k} | E, \ell, m \rangle = \frac{\hbar}{\sqrt{mk}} \delta\left(\frac{\hbar^2 k^2}{2m} - E\right) Y_{\ell}^m(\hat{\mathbf{k}})$$

$$\langle \mathbf{x} | E, \ell, m \rangle = \frac{i^{\ell}}{\hbar} \sqrt{\frac{2mk}{\pi}} j_{\ell}(kr) Y_{\ell}^m(\hat{\mathbf{r}})$$

Para casa (2): *analise o decaimento*  $\text{Ne}^{20*} \rightarrow \text{O}^{16} + \text{He}^4$ , *considerando que o “pai” ( $\text{Ne}^{20*}$ ) está inicialmente com spin 1 e que os filhos ( $\text{O}^{16} + \text{He}^4$ ) ficam ambos com spin zero.*

## Ondas parciais e deslocamentos de fase

O método de ondas parciais para o problema de espalhamento.

$$\text{Considere } V \neq 0, \text{ mas (para simplificar) } V(\mathbf{x}) = V(r) \Rightarrow \begin{cases} [V, L^2] = 0 \\ [V, L_z] = 0 \end{cases}$$

O operador de transição  $T$  definido anteriormente por:

$$T = V + V \frac{1}{E_i - H_0 + i\hbar\epsilon} V + V \frac{1}{E_i - H_0 + i\hbar\epsilon} V \frac{1}{E_i - H_0 + i\hbar\epsilon} V + \dots$$

também comuta com  $\mathbf{L}^2$  e  $\mathbf{L} \rightarrow \therefore T$  é um operador escalar. Aplicação

$$\text{do teorema de Wigner-Eckart } \langle \alpha', j' m' | S | \alpha, j m \rangle = \delta_{jj'} \delta_{mm'} \frac{\langle \alpha', j' || S || \alpha, j \rangle}{\sqrt{2j+1}}$$

onde a barra dupla, indica que não depende de  $m$  e  $m'$ , permite escrever

$$\langle E, \ell' m' | T | E, \ell m \rangle = T_\ell(E) \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'}$$

Isso traz uma **mensagem importante**:

*O potencial esfericamente simétrico não consegue alterar  $\ell$  e  $m$  no processo de espalhamento.*

## Ondas parciais e deslocamentos de fase

A amplitude de espalhamento  $f(\mathbf{k}', \mathbf{k}) = -\frac{1}{4\pi} \frac{2m}{\hbar^2} (2\pi)^3 \langle \mathbf{k}' | T | \mathbf{k} \rangle$  pode ser escrita por:

$$-\frac{1}{4\pi} \frac{2m}{\hbar^2} (2\pi)^3 \sum_{\ell m} \sum_{\ell' m'} \int dE \int dE' \langle \mathbf{k}' | E', \ell', m' \rangle \langle E', \ell', m' | T | E, \ell, m \rangle \langle E, \ell, m | \mathbf{k} \rangle$$

Usando que  $\begin{cases} \langle \mathbf{k} | E, \ell, m \rangle = \frac{\hbar}{\sqrt{mk}} \delta\left(\frac{\hbar^2 k^2}{2m} - E\right) Y_\ell^m(\hat{\mathbf{k}}) \\ \langle E', \ell' m' | T | E, \ell m \rangle = T_\ell(E) \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'} \end{cases} \implies$  obtemos:

$$f(\mathbf{k}', \mathbf{k}) = -\frac{1}{4\pi} \frac{2m}{\hbar^2} (2\pi)^3 \frac{\hbar^2}{mk} \sum_{\ell m} T_\ell(E) \Big|_{E=\frac{\hbar^2 k^2}{2m}} Y_\ell^m(\hat{\mathbf{k}}') Y_\ell^{m*}(\hat{\mathbf{k}})$$

ou melhor:  $f(\mathbf{k}', \mathbf{k}) = -\frac{4\pi^2}{k} \sum_{\ell m} T_\ell(E) \Big|_{E=\frac{\hbar^2 k^2}{2m}} Y_\ell^m(\hat{\mathbf{k}}') Y_\ell^{m*}(\hat{\mathbf{k}})$

Para obter a dependência angular da amplitude de espalhamento, vamos escolher  $\hat{\mathbf{k}}$  na direção  $\hat{\mathbf{z}}$  (direção do feixe incidente no referencial

do laboratório). Nestas condições  $Y_\ell^m(\hat{\mathbf{k}}) = Y_\ell^m(\hat{\mathbf{z}}) = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi}} \delta_{m0}$

mostre



## Ondas parciais e deslocamentos de fase

A amplitude de espalhamento fica

$$f(\mathbf{k}', \mathbf{k}) = -\frac{4\pi^2}{k} \sum_{\ell} T_{\ell}(E) \Big|_{E=\frac{\hbar^2 k^2}{2m}} Y_{\ell}^0(\hat{\mathbf{k}}') \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi}}, \text{ onde (mostre)}$$

$$Y_{\ell}^0(\hat{\mathbf{k}}') = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi}} P_{\ell}(\cos \theta). \text{ Definindo, } f_{\ell} = -\frac{\pi}{k} T_{\ell}(k), \text{ temos}$$

$$f(\mathbf{k}', \mathbf{k}) = f(\theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell+1) f_{\ell}(k) P_{\ell}(\cos \theta)$$

Para entender o significado físico de  $f_{\ell}(k)$ , vamos estudar o comportamento à longas distâncias de  $\langle \mathbf{x} | \Psi_{\mathbf{k}}^{(+)} \rangle$ , isto é:

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \langle \mathbf{x} | \Psi_{\mathbf{k}}^{(+)} \rangle = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \left( e^{ik \cdot z} + \frac{e^{ikr}}{r} f(\theta) \right)$$

Do slide 6, temos  $e^{ikz} = \sum_{\ell} (2\ell+1) i^{\ell} j_{\ell}(kr) P_{\ell}(\cos \theta)$  onde (mostre)

$$\lim_{r \rightarrow \infty} j_{\ell}(kr) = \frac{e^{+i(kr-\ell\pi/2)} - e^{-i(kr-\ell\pi/2)}}{2ikr} = \underbrace{e^{-i\ell\pi/2}}_{i^{-\ell}} \left( \frac{e^{+ikr} - e^{-i(kr-\ell\pi)}}{2ikr} \right)$$

$$\text{assim } \lim_{r \rightarrow \infty} e^{ikz} = \sum_{\ell} (2\ell+1) P_{\ell}(\cos \theta) \left( \frac{e^{+ikr} - e^{-i(kr-\ell\pi)}}{2ikr} \right)$$

Aula 14 Colocando os resultados das caixa verdes na caixa azul do slide anterior, temos:

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \langle \mathbf{x} | \Psi_{\mathbf{k}}^{(+)} \rangle = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \sum_{\ell} (2\ell + 1) P_{\ell}(\cos \theta) \left( \frac{e^{+ikr} - e^{-i(kr - \ell\pi)}}{2ikr} + \frac{e^{ikr}}{r} f_{\ell}(k) \right)$$

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \langle \mathbf{x} | \Psi_{\mathbf{k}}^{(+)} \rangle = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \sum_{\ell} (2\ell + 1) \frac{P_{\ell}(\cos \theta)}{2ik} \left( \underbrace{[1 + 2ik f_{\ell}(k)]}_{\text{potencial só afeta a onda esférica que sai}} \frac{e^{+ikr}}{r} - \frac{e^{-i(kr - \ell\pi)}}{r} \right)$$

*o potencial só afeta a  
onda esférica que sai*

O coeficiente da onda esférica emergente  $[1 + 2ik f_{\ell}(k)] = 1$ , se  $V = 0$ .

Se construíssemos pacotes, o pacote associado à  $\frac{e^{ikr}}{r}$  só existiria p/  $cte \leq t \leq \infty$

e o associado à  $\frac{e^{-ikr}}{r}$  só existiria p/  $-\infty \leq t \leq cte'$ . Assim, como o  $|\Psi_{\mathbf{k}}^{(+)}\rangle$

contém a informação completa (antes e depois da colisão), é de se esperar que:

$\oint \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = 0$ . As partículas que entram devem sair (se não há ralos e fontes).

Assim, o fluxo associado à  $\frac{e^{ikr}}{r}$  deve ser igual ao fluxo associado à  $\frac{e^{-ikr}}{r}$ . Isso

deve valer para cada onda parcial. Para calcular esses fluxos, defina antes

$$S_{\ell} \equiv 1 + 2ik f_{\ell}(k).$$

## Ondas parciais e deslocamentos de fase

Assim, a partir de  $\mathbf{J} = \frac{\hbar}{m} \text{Im}(\psi^* \nabla \psi)$  podemos escrever

$$\left| \int r^2 d\Omega \text{Im} \left( S_\ell^* \frac{e^{-ikr}}{r} \frac{\partial}{\partial r} S_\ell \frac{e^{ikr}}{r} \right) \right| = \left| \int r^2 d\Omega \text{Im} \left( \frac{e^{-i(kr-\ell\pi)}}{r} \frac{\partial}{\partial r} \frac{e^{-i(kr-\ell\pi)}}{r} \right) \right|$$

$$4\pi |S_\ell|^2 = 4\pi \implies |S_\ell| = 1 \text{ (fruto da conservação de fluxo).}$$

Se  $|S_\ell| = 1$ , é sugestiva a seguinte definição:  $S_\ell = e^{2i\delta_\ell}$   $\left\{ \begin{array}{l} \delta_\ell \equiv \left\{ \begin{array}{l} \text{deslocamento} \\ \text{de fase} \end{array} \right. \\ \delta_\ell \rightarrow \text{número real} \\ \text{o 2 é convenção} \end{array} \right.$

*O que deixa claro que a existência do potencial pode no máximo infligir uma mudança de fase na onda esférica emergente. Como  $S_\ell \equiv 1 + 2ikf_\ell(k)$ ,*

podemos escrever  $f_\ell = \frac{e^{2i\delta_\ell} - 1}{2ik} = \frac{e^{i\delta_\ell} \sin \delta_\ell}{k} = \frac{\sin \delta_\ell}{ke^{-i\delta_\ell}} = \frac{\sin \delta_\ell}{k(\cos \delta_\ell - i \sin \delta_\ell)}$

Ou ainda  $f_\ell = \frac{1}{k(\cot \delta_\ell - i)}$ . Assim,  $f(\theta) = \frac{1}{k} \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell + 1) e^{i\delta_\ell} \sin \delta_\ell P_\ell(\cos \theta)$

esta forma será útil

*Note que para deduzir isso, usamos apenas Invariança Rotacional e conservação de probabilidade.*